



Cobertura de salud preventiva solo para usted

Geisinger
PLAN MÉDICO

Atención preventiva

Todo el mundo quiere mantenerse sano, feliz y vivir la vida que ama. Es por eso que damos el más alto nivel de servicios de atención preventiva recomendados por agencias estatales y federales como el Grupo de Trabajo de Servicios Preventivos de los EE. UU., el Comité Asesor sobre Prácticas de Inmunización para vacunas, la Academia Americana de Pediatría y otros. Visite la sección del calendario de vacunación en [cdc.gov](https://www.cdc.gov) para obtener más información.

Muchos de los servicios preventivos listados están cubiertos sin costos compartidos para los miembros con un médico participante o preferido. (Es posible que haya costos compartidos si un médico presta servicios adicionales que no forman parte de la lista de atención preventiva). La receta debe hacerse por escrito o verbalmente y presentarse en una farmacia preferida o en una farmacia de pedidos por correo preferida para que el plan cubra todas las vacunas y suplementos de venta libre.

Desde los exámenes médicos hasta los recordatorios de vacunas, estamos aquí para ayudar a que una mejor salud sea más fácil para todos.

Exámenes y vacunas para bebés y niños sanos – desde recién nacidos hasta los 21 años

Servicio	Cobertura
Anemia	<ul style="list-style-type: none"> • 4 meses según la evaluación de riesgos • 12 meses • 15 meses a 21 años según la evaluación de riesgos
Detección de trastornos del espectro autista	<ul style="list-style-type: none"> • 18 y 24 meses
Evaluación conductual/social/emocional	<ul style="list-style-type: none"> • Anualmente desde que es recién nacido hasta los 21 años
presión	<ul style="list-style-type: none"> • Recién nacido hasta los 30 meses según la evaluación de riesgos, luego anualmente entre los 3 y los 21 años
Índice de masa corporal (BMI)	<ul style="list-style-type: none"> • 24 meses, 30 meses, luego anualmente hasta los 21 años
Detección de hipotiroidismo congénito	<ul style="list-style-type: none"> • Todos los recién nacidos • Nota: Los bebés nacidos prematuros, enfermos o con muy bajo peso al nacer pueden beneficiarse de más de un examen de detección debido a una menor sensibilidad y especificidad de la prueba.
Defecto cardíaco congénito crítico	<ul style="list-style-type: none"> • Al nacer
Evaluación para la detección de depresión y riesgo de suicidio	<ul style="list-style-type: none"> • Anualmente entre 12-21 años
Evaluación del desarrollo	<ul style="list-style-type: none"> • 9, 18 y 30 meses
Control del desarrollo	<ul style="list-style-type: none"> • Recién nacido, 3-5 días • 1-6 meses; 12, 15, 24 meses; anualmente entre 3-21 años
Dislipidemia (trastornos del colesterol/lípidos)	<ul style="list-style-type: none"> • 24 meses según la evaluación de riesgos • 4, 6, 8, 9-11, 12, 13, 14, 15, 16, 17-21 años según la evaluación de riesgos
Suplementación con fluoruro	<ul style="list-style-type: none"> • 6, 9, 12, 18, 24, 30 meses; luego anualmente entre los 3 y los 16 años según la evaluación de riesgos
Barniz de flúor	<ul style="list-style-type: none"> • 6 meses a 5 años
Examen médico de la audición <i>Nota: Examen de audición no completo</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Recién nacido, de 3-5 días a 2 meses, de 4 meses a 3 años según la evaluación de riesgos, anualmente de 4-6 años, a los 8 años, 10 años, de 11 a 14 años, de 15 a 17 años y de 18 a 21 años • Otros años según la evaluación de riesgos
Índice de masa corporal (BMI) elevado en niños y adolescentes: intervenciones	<ul style="list-style-type: none"> • Se recomienda a los médicos que proporcionen o remitan a los niños y adolescentes de 6 años o más con un BMI alto (\geq percentil 95 para la edad y el sexo) a intervenciones conductuales intensivas y completas.

Exámenes e inmunizaciones para bebés y niños sanos: desde recién nacidos hasta los 21 años (continuación)

Servicio	Cobertura
Historia, longitud/altura, peso, circunferencia de la cabeza y examen físico.	<ul style="list-style-type: none"> • Recién nacido hasta 24 meses • Visita adicional entre 2-4 días para bebés dados de alta menos de 48 horas después del parto
VIH	<ul style="list-style-type: none"> • 11, 12, 13, 14 años según la evaluación de riesgos • Una vez entre 15-18 años • Entre 19-21 años según la evaluación de riesgos
Vacunas <i>Nota: Las vacunas necesarias para viajes internacionales no están cubiertas</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Desde recién nacidos hasta los 21 años siguiendo el calendario de vacunación de la Academia Americana de Pediatría publicaciones.aap.org/redbook/pages/immunization-schedules • ¿Tiene preguntas sobre la cobertura de vacunas? Llame al número que figura en la parte de atrás de su tarjeta de identificación de miembro.
Plomo	<ul style="list-style-type: none"> • 6, 9, 12, 18, 24 meses según la evaluación de riesgos • Entre 3-6 años según la evaluación de riesgos
Examen de detección de depresión materna	<ul style="list-style-type: none"> • 1, 2, 4 y 6 meses en las visitas de niño sano
Metabólicos/hemoglobinopatías	<ul style="list-style-type: none"> • Según la ley estatal • Todos los recién nacidos
Bilirrubina en recién nacidos	<ul style="list-style-type: none"> • Al nacer
Extracción de sangre del recién nacido	<ul style="list-style-type: none"> • Al nacer, entre 3-5 días • Extracciones de sangre adicionales según la evaluación de riesgos
Salud dental	<ul style="list-style-type: none"> • Entre 6 y 9 meses • 12, 18, 24, 30 meses y anualmente entre 3-6 años según la evaluación de riesgos
Detección de PKU	<ul style="list-style-type: none"> • Al nacer
Medicamentos oculares (ojos) profilácticos para prevenir la ceguera secundaria a la conjuntivitis neonatal gonocócica	<ul style="list-style-type: none"> • Todos los recién nacidos
Infecciones de transmisión sexual	<ul style="list-style-type: none"> • Anualmente entre 11-21 años, según la evaluación de riesgos
Detección de la enfermedad de células falciformes	<ul style="list-style-type: none"> • Todos los recién nacidos
Evaluación del consumo de tabaco, alcohol o drogas	<ul style="list-style-type: none"> • Entre 11-21 años según la evaluación de riesgos

Exámenes e inmunizaciones para bebés y niños sanos: desde recién nacidos hasta los 21 años (continuación)

Servicio	Cobertura
Consumo de tabaco en niños y adolescentes: intervenciones de atención primaria	<ul style="list-style-type: none">• Intervenciones, incluyendo la educación u orientación breve, para prevenir el inicio del consumo de tabaco entre niños y adolescentes en edad escolar que no han comenzado a consumir tabaco
Tuberculosis	<ul style="list-style-type: none">• Meses 1, 6, 12, 24 y anualmente a partir de los 3 años según la evaluación de riesgos según lo indiquen los antecedentes o los síntomas.
Examen médico de la vista <i>Nota: Examen ocular no completo</i>	<ul style="list-style-type: none">• Recién nacido hasta los 30 meses según la evaluación de riesgos, anualmente entre 3–6 años, luego cada dos años incluyendo hasta los 15 años (o anualmente según la evaluación de riesgos)• Al menos una vez en todos los niños de 3 a 5 años para detectar la ambliopía (ojo perezoso) o sus factores de riesgo

Exámenes e intervenciones médicas para adultos jóvenes y adultos

Servicio	Cobertura
Aneurisma aórtico abdominal; una sola evaluación	<ul style="list-style-type: none"> Hombres de 65–75 años que hayan fumado alguna vez Limitada a una de por vida
Examen médico de detección de ansiedad	<ul style="list-style-type: none"> Detección de ansiedad en todos los adultos, incluyendo las personas embarazadas o en posparto
Detección de presión (hipertensión)	<ul style="list-style-type: none"> En adultos mayores de 18 años con medición de la presión en el consultorio
Cáncer relacionado con BRCA: Evaluación de riesgos, orientación genética y pruebas genéticas	<ul style="list-style-type: none"> Orientación genética para adultos con antecedentes familiares de cáncer de ovario o de mama Si está indicado después de la orientación genética, una prueba de laboratorio genético de los genes BRCA1 y BRCA2 para personas consideradas con mayor riesgo, de acuerdo a una herramienta de evaluación de riesgos clínicos, de mutaciones potencialmente dañinas en los genes BRCA1 o BRCA2 por antecedentes personales o familiares de cáncer de mama u ovario (Ley PA 1 de 2023)
Displasia cervical	<ul style="list-style-type: none"> 21 años
Trastornos del colesterol/lípidos y uso de estatinas	<ul style="list-style-type: none"> Uso de una estatina para la prevención de enfermedades cardiovasculares en adultos de 40–75 años que tienen más de 1 factor de riesgo de enfermedades cardiovasculares (p. ej., dislipidemia, diabetes, hipertensión, tabaquismo) y un riesgo calculado de 10 años de sufrir un acontecimiento cardiovascular mayor del 10 %.
Examen de detección de cáncer colorrectal <i>Nota: Los medicamentos de marca de fuente única (medicamentos de marca sin un equivalente genérico) y los medicamentos genéricos están cubiertos sin costo compartido para miembros de 45 a 75 años.</i>	<ul style="list-style-type: none"> Las siguientes pruebas para todos los adultos de 45–75 años <ol style="list-style-type: none"> Prueba de sangre oculta en heces de alta sensibilidad (gFOBT) o prueba inmunoquímica fecal (FIT) anualmente o sDNA-FIT cada 1 a 3 años Sigmoidoscopia flexible cada 5 años Colonoscopia cada 10 años Colonografía por TC cada 5 años
Detección de depresión y riesgo de suicidio en adultos	<ul style="list-style-type: none"> Detección de la depresión en la población adulta general, incluyendo las personas embarazadas y en posparto, y en adultos mayores
Detección de diabetes: prediabetes y diabetes tipo 2	<ul style="list-style-type: none"> Adultos asintomáticos de 35–70 años con sobrepeso u obesidad Incluye detección de HbA1c, detección de colesterol LDL y detección de nefropatía
Prevención de caídas en adultos mayores	<ul style="list-style-type: none"> Intervenciones de ejercicios para adultos de 65 años o más que viven en la comunidad y que tienen mayor riesgo de caídas
Estudio de detección de hepatitis B	<ul style="list-style-type: none"> Adolescentes y adultos con mayor riesgo de infección
Detección de la infección por el virus de la hepatitis C (VHC)	<ul style="list-style-type: none"> Adultos de 18–79 años
Prevención de la infección por VIH: Profilaxis preexposición (PrEP) <i>Nota: Eso incluye servicios iniciales y de monitoreo asociados a la dispensación de PrEP.</i>	<ul style="list-style-type: none"> Se recomienda a los médicos que receten profilaxis previa a la exposición (PrEP) utilizando una terapia antirretroviral eficaz, a las personas que tienen un mayor riesgo de contraer el VIH para disminuir el riesgo de contraer el VIH.

Exámenes e intervenciones médicas para adultos jóvenes y adultos (continuación)

Servicio	Cobertura
Evaluación para la detección del VIH	<ul style="list-style-type: none"> • Adolescentes y adultos de 15–65 años • Los adolescentes más jóvenes y los adultos mayores tienen mayor riesgo de infección
Examen de cáncer de pulmón – Tomografía computarizada de baja dosis	<ul style="list-style-type: none"> • Examen de detección anual con tomografía computarizada de baja dosis (LDCT) en adultos de 50–80 años que tienen antecedentes de fumar 20 paquetes por año, fuman actualmente o han dejado de fumar en los últimos 15 años
Orientación nutricional	<ul style="list-style-type: none"> • Ofrecer o remitir a adultos con factores de riesgo de enfermedad cardiovascular a intervenciones de orientación conductual para promover una dieta saludable y actividad física
Prevención del herpes zóster (culebrilla)	<ul style="list-style-type: none"> • Vacunación de personas de 50 años y más
Orientación sobre infecciones de transmisión sexual (STI)	<ul style="list-style-type: none"> • Todos los adolescentes y adultos sexualmente activos que tienen mayor riesgo de contraer infecciones de transmisión sexual (STI)
Orientación conductual sobre el cáncer de piel	<ul style="list-style-type: none"> • Orientación para todos los adultos jóvenes, adolescentes, niños y padres de niños pequeños sobre cómo minimizar la exposición a los rayos ultravioleta (UV) de personas de 6 meses a 24 años con tipos de piel clara para reducir su riesgo de cáncer de piel
Paro cardíaco repentino/muerte	<ul style="list-style-type: none"> • Entre 17–21 años según la evaluación de riesgos
Infección por sífilis: examen de detección	<ul style="list-style-type: none"> • Todas las personas que corren un mayor riesgo de infección
Intervenciones para dejar de fumar/ consumir tabaco	<ul style="list-style-type: none"> • Se recomienda a los médicos que pregunten a todos los adultos sobre el consumo de tabaco, los aconsejen que dejen el tabaco y den intervenciones conductuales y farmacoterapia aprobada por la Administración de Alimentos y Medicamentos de los EE. UU. (FDA) para dejar el tabaco en personas adultas no embarazadas que consumen tabaco
Prueba de la tuberculina	<ul style="list-style-type: none"> • Detección de infecciones tuberculosas latentes en poblaciones con mayor riesgo
Consumo no saludable de alcohol en adolescentes y adultos: intervenciones de detección y orientación conductual	<ul style="list-style-type: none"> • Detección del consumo no saludable de alcohol en entornos de atención primaria en adultos mayores de 18 años, incluyendo personas embarazadas, y dar a las personas involucradas en un consumo riesgoso o peligroso intervenciones breves de orientación conductual para reducir el consumo no saludable de alcohol
Detección de consumo de drogas no saludables	<ul style="list-style-type: none"> • Evaluación mediante preguntas sobre el uso no saludable de drogas en adultos mayores de 18 años
Pérdida de peso para prevenir la morbilidad y la mortalidad relacionadas con la obesidad en adultos: Intervenciones conductuales	<ul style="list-style-type: none"> • Ofrecer o remitir a adultos con un índice de masa corporal (BMI) de más de 30 (calculado en peso en kilogramos dividido por altura en metros al cuadrado) a intervenciones conductuales multicomponentes intensivas

Exámenes e intervenciones médicas de la mujer

Servicio	Cobertura
Detección de bacteriuria	<ul style="list-style-type: none"> Examen de detección de bacteriuria asintomática mediante urocultivo en embarazadas
Cáncer relacionado con BRCA: evaluación de riesgos, orientación genética y pruebas genéticas	<ul style="list-style-type: none"> Mujeres con antecedentes personales o familiares de cáncer de mama, ovario, trompas o peritoneal o con ascendencia asociada a mutaciones en los genes de susceptibilidad 1 y 2 al cáncer de mama (BRCA1/2) con una herramienta breve adecuada de evaluación de riesgos familiares Orientación genética para personas que tienen antecedentes familiares de cáncer de ovario o de mama Si está indicado después de la orientación genética, una prueba de laboratorio genético de los genes BRCA1 y BRCA2 para quienes están considerados con mayor riesgo, según una herramienta de evaluación de riesgos clínicos, de mutaciones potencialmente dañinas en los genes BRCA1 o BRCA2 por antecedentes personales o familiares de cáncer de mama u ovario (Ley PA 1 de 2023)
Detección de cáncer de mama (mamografía) para mujeres con riesgo promedio	<ul style="list-style-type: none"> Mamografía de detección bienal para mujeres de 40–74 años Las mujeres con riesgo promedio deben iniciar la mamografía de detección no antes de los 40 años ni después de los 50; la mamografía de detección debe hacerse al menos cada dos años y con una frecuencia anual; la detección debe continuar al menos hasta los 74 años y la edad por sí sola no debe ser la base para interrumpir el examen de detección Los beneficios de la mamografía se pagan únicamente si los hace un médico del servicio de mamografía que esté debidamente certificado por el Departamento de Salud según la Ley de Garantía de Calidad de Mamografía de 1992
Medicamentos preventivos contra el cáncer de mama.	<ul style="list-style-type: none"> Mujeres con riesgo de cáncer de mama y bajo riesgo de sufrir efectos adversos de los medicamentos
Detección de cáncer de mama para mujeres que se cree que tienen un mayor riesgo de padecer cáncer de mama/tejido mamario extremadamente denso (detección anual complementaria)	<ul style="list-style-type: none"> Imágenes por resonancia magnética (MRI) o ultrasonido suplementario anual para mujeres con mayor riesgo de cáncer de mama/tejido mamario extremadamente denso (BI-RADS nivel 3 y 4) si lo recomienda el médico tratante (Ley PA 1 de 2023)
Promoción de la lactancia materna	<ul style="list-style-type: none"> Durante el embarazo y después del parto

Exámenes médicos e intervenciones para la salud de la mujer (continuación)

Servicio	Cobertura
Servicios y suministros para la lactancia materna	<ul style="list-style-type: none"> • Servicios integrales de apoyo a la lactancia (incluyendo consultas y orientación, educación por parte de médicos y servicios de apoyo entre pares (excepto el apoyo entre pares en materia de salud mental y consumo de sustancias) y equipos y suministros para la lactancia materna) a cargo de un médico capacitado durante los períodos prenatal, perinatal, de embarazo o posparto para optimizar el inicio y el mantenimiento exitosos de la lactancia materna. • Los equipos y los suministros para la lactancia materna incluyen, entre otros, extractores de leche eléctricos dobles (incluyendo las piezas y el mantenimiento del extractor) y suministros para almacenar leche materna; el acceso a extractores de leche eléctricos dobles debe ser una prioridad para optimizar la lactancia materna y no debe basarse en una falla previa de un extractor manual • El equipo de lactancia también puede incluir equipos y suministros clínicamente indicados para apoyar a las dadas con dificultades para amamantar y a quienes necesitan servicios adicionales • Los gastos de alquiler del material de lactancia están cubiertos
Cáncer de cuello uterino y hrHPV: examen de detección	<ul style="list-style-type: none"> • Cada 3 años en mujeres de 21–65 años, si no se combina con la prueba del virus del papiloma humano de alto riesgo (hrHPV) • Para mujeres de 30–65 años, citología cervical cada 5 años si se combina con la prueba de hrHPV
Examen de detección de clamidia	<ul style="list-style-type: none"> • Todas las mujeres sexualmente activas de 24 años o menos • Mujeres adultas de 25 años o más que estén en riesgo
Detección de diabetes después del embarazo	<ul style="list-style-type: none"> • Las mujeres con antecedentes de diabetes mellitus gestacional que no estén actualmente embarazadas y que no hayan obtenido previamente un diagnóstico de diabetes mellitus tipo 2 deben someterse a pruebas de detección de diabetes mellitus
Detección y orientación sobre violencia doméstica e interpersonal	<ul style="list-style-type: none"> • Hacer exámenes de detección de violencia interpersonal y doméstica a adolescentes y mujeres al menos una vez al año y, cuando sea necesario, dar o remitir a servicios de intervención inicial
Métodos anticonceptivos femeninos y orientación.	<ul style="list-style-type: none"> • Todos los métodos anticonceptivos aprobados por la Administración de Alimentos y Medicamentos, los procedimientos de esterilización y la educación y orientación de pacientes para todas las mujeres con capacidad reproductiva están cubiertos según lo recetado por el médico o el obstetra/ginecólogo participante del miembro; la atención anticonceptiva incluye detección, educación, orientación y entrega de anticonceptivos (incluyendo en el período posparto inmediato)
Suplementación con ácido fólico	<ul style="list-style-type: none"> • Todas las personas que tienen previsto o pueden quedar embarazadas deben tomar un suplemento diario que contenga entre 0.4 y 0.8 mg (400 a 800 µg) de ácido fólico
Examen de detección de gonorrea	<ul style="list-style-type: none"> • Todas las mujeres sexualmente activas de 24 años o menos • Mujeres adultas de 25 años o más que estén en riesgo

Exámenes médicos e intervenciones para la salud de la mujer (continuación)

Servicio	Cobertura
Peso saludable y aumento de peso en el embarazo	<ul style="list-style-type: none"> Ofrecer a las personas embarazadas intervenciones efectivas de orientación conductual destinadas a promover un aumento de peso saludable y prevenir un aumento excesivo de peso gestacional durante el embarazo
Estudio de detección de hepatitis B	<ul style="list-style-type: none"> Personas embarazadas en su primera visita prenatal
Evaluación de detección del VIH	<ul style="list-style-type: none"> Todas las personas embarazadas, incluyendo quienes se presentan en labor de parto o en el momento del parto, y que el estado serológico respecto del VIH se desconoce Una prueba de detección del VIH para todas las mujeres adolescentes y adultas, de 15 años de edad o más, al menos una vez durante su vida; la detección temprana o adicional debe basarse en el riesgo; la repetición de la detección anualmente o con mayor frecuencia puede ser adecuada a partir de los 13 años para las mujeres adolescentes y adultas con un mayor riesgo de infección por VIH Evaluación de riesgos y educación para la prevención de la infección por VIH a partir de los 13 años y de forma continua según lo determine el riesgo
Prevención de la obesidad en mujeres de mediana edad.	<ul style="list-style-type: none"> Orientación a mujeres de mediana edad de 40 a 60 años con un índice de masa corporal (BMI) normal o con sobrepeso (de 18.5 a 29.9 kg/m²) para mantener el peso o limitar el aumento de peso para prevenir la obesidad
Pruebas de detección de osteoporosis	<ul style="list-style-type: none"> Mujeres en riesgo: puede incluir, entre otras cosas, una exploración DEXA (prueba de imágenes por rayos X que mide la densidad ósea para detectar osteoporosis) Mujeres de 65 años y más Personas posmenopáusicas menores de 65 años que tienen un mayor riesgo de osteoporosis, según lo determinado por una herramienta formal de evaluación de riesgo clínico
Depresión perinatal	<ul style="list-style-type: none"> Los médicos dan o remiten a las personas embarazadas y en período de posparto que tienen un mayor riesgo de depresión perinatal a intervenciones de orientación
Prueba de incompatibilidad de Rh – Prueba de anticuerpos y tipificación sanguínea Rh (D)	<ul style="list-style-type: none"> Tipificación sanguínea Rh(D) y prueba de anticuerpos para todas las mujeres embarazadas durante su primera visita de atención relacionada con el embarazo Pruebas repetidas de anticuerpos Rh(D) para todas las mujeres Rh(D) negativas no sensibilizadas entre las 24 y 28 semanas de gestación, a menos que se sepa que el padre biológico es Rh(D) negativo.
Detección de diabetes en el embarazo	<ul style="list-style-type: none"> Personas embarazadas de 24 semanas de gestación o posteriores Las mujeres con factores de riesgo de diabetes tipo 2 o diabetes mellitus gestacional (DMG) deben someterse a pruebas de detección de diabetes preexistente antes de las 24 semanas de gestación, idealmente en la primera visita prenatal, según las mejores prácticas clínicas actuales
Examen de detección de trastornos hipertensivos del embarazo	<ul style="list-style-type: none"> Examen de detección de trastornos hipertensivos en personas embarazadas con mediciones de presión arterial durante todo el embarazo

Exámenes médicos e intervenciones para la salud de la mujer (continuación)

Servicio	Cobertura
Infecciones de transmisión sexual (STI), orientación	<ul style="list-style-type: none"> Orientación conductual dirigida para mujeres adultas y adolescentes sexualmente activas con mayor riesgo de contraer ITS; si las adolescentes y mujeres no identificadas como de alto riesgo, se debe considerar la orientación para reducir el riesgo de contraer ITS, según lo determine el criterio clínico
Examen médico de detección de la sífilis	<ul style="list-style-type: none"> Examen de detección temprana de infección por sífilis en todas las embarazadas
Intervenciones para dejar de fumar/ consumir tabaco	<ul style="list-style-type: none"> Se recomienda a los médicos que pregunten a todas las mujeres embarazadas sobre el consumo de tabaco, les aconsejen que dejen el tabaco y den intervenciones conductuales para dejar de fumar a las mujeres embarazadas que consumen tabaco
Detección de incontinencia urinaria	<ul style="list-style-type: none"> Examen anual de detección de incontinencia urinaria en mujeres
Visitas preventivas de bienestar femenino	<ul style="list-style-type: none"> Al menos una visita de atención preventiva por año comenzando en la adolescencia y continuando durante toda la vida Estos servicios pueden hacerse en una sola visita o como parte de una serie de visitas a lo largo del tiempo para obtener todos los servicios necesarios según la edad de la mujer, su estado de salud, sus necesidades de salud reproductiva, su estado de embarazo y sus factores de riesgo Las visitas de control de la mujer también incluyen visitas previas al embarazo, prenatales, posparto e interembarazo

Muchos de estos servicios preventivos están cubiertos sin costo compartido para los miembros cuando se obtienen de un médico participante/preferido, a menos que se indique lo contrario. Si su médico presta servicios médicos durante su visita de atención preventiva que no están incluidos en la lista de atención preventiva, estos artículos se considerarán bajo la cobertura de su plan médico estándar. Eso significa que usted puede ser responsable de los costos compartidos. Consulte los materiales de su plan para obtener información específica sobre la cobertura de su plan.

Este documento pretende ser un resumen de fácil lectura. Los beneficios, limitaciones y exclusiones se dan según los documentos de beneficios y las cláusulas aplicables bajo las que está inscrito un miembro. Es posible que este plan de atención administrada no cubra todos sus gastos de atención médica. Lea con detenimiento su Certificado de suscripción y sus cláusulas adicionales para determinar qué servicios de atención médica tienen cobertura.

Estos servicios de salud preventivos tienen como base las recomendaciones del Grupo de Trabajo de Servicios Preventivos de EE. UU. (recomendaciones A y B), el Comité Asesor sobre Prácticas de Inmunización (ACIP) para inmunizaciones, el Programa de Periodicidad de las Recomendaciones Bright Futures para la Atención Médica Preventiva Pediátrica de la Academia Americana de Pediatría y las Directrices de Servicios Preventivos para Mujeres respaldadas por Recursos y Servicios de Salud (HRSA); además están sujetos a cambios por parte de estas organizaciones. Para obtener la lista más actualizada de servicios preventivos cubiertos, consulte: <https://www.healthcare.gov/what-are-my-preventive-care-benefits>. Para obtener información adicional sobre las vacunas, visite la sección del calendario de vacunación de [cdc.gov](https://www.cdc.gov).

Geisinger Health Plan puede hacer referencia colectivamente a los patrocinadores de cobertura de atención médica Geisinger Health Plan, Geisinger Quality Options, Inc. y Geisinger Indemnity Insurance Company, a menos que se indique lo contrario. Geisinger Health Plan es parte de Geisinger, una organización de cobertura y atención médica integrada.